



Mathematik Cheat Sheet

1. Allgemeines

1.1. Zahlenmengen

- \mathbb{N} = natürliche Zahlen = $\{1, 2, 3, \dots\}$
- \mathbb{Z} = ganze Zahlen = $\{\dots, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- \mathbb{Q} = rationale Zahlen, z.B. $\frac{p}{q}$ ($p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$)
- \mathbb{R} = reelle Zahlen, „alle Zahlen“, z.B. π
- \mathbb{C} = komplexe Zahlen = $\{a + ib \mid i = \sqrt{-1}, a, b \in \mathbb{R}\}$

Für Intervalle: Runde Klammer schließt die Grenzen aus, Eckige Klammern ein.

1.2. Binomialkoeffizienten

- $\binom{n}{j} = \frac{n!}{j!(n-j)!}$, für $j \leq n$
- $\binom{n}{j} = \binom{n}{n-j}$
- $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

1.3. Binomische Formeln

- Binomische Formel: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 - Binomische Formel: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
 - Binomische Formel: $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
- Binomischer Lehrsatz: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Den Binomischen Lehrsatz kannst du auch aus dem pascalschen Dreieck entnehmen.

1.4. Quadratische Gleichung

1.4.1. p-q Formel

Grundlage ist ein Polynom: $x^2 + px + q = 0$

$$x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

1.4.2. Mitternachtsformel

Grundlage ist ein Polynom: $ax^2 + bx + c = 0$

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

1.5. Potenzrechnung

$$\begin{aligned} a^n \cdot a^m &= a^{n+m} & e^{lnx} &= x \\ a^n \cdot b^n &= (a \cdot b)^n & a^{-n} &= \frac{1}{a^n} \\ \frac{a^n}{a^m} &= a^{n-m} & -a^{-1} &= \frac{-1}{a} = \frac{a^{-1}}{-1} \\ \frac{a^n}{b^n} &= \left(\frac{a}{b}\right)^n & (a^m)^n &= (a^n)^m = a^{m \cdot n} \end{aligned}$$

1.6. Bruchrechnung

Division $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$ Multiplizieren mit dem Kehrwert
 Multiplikation $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$
 Kürzen $\frac{2}{2 \cdot 3} = \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$ Nur Faktoren, keine Summanden!!

Trick 17: $\frac{x-1}{x+4} = \frac{x+4-5}{x+4} = \frac{x+4}{x+4} - \frac{5}{x+4} = 1 - \frac{5}{x+4}$

1.7. Wurzelrechnung

$$\begin{aligned} \sqrt[m]{a^m} &= (a^m)^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{m}{m}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m = (\sqrt[n]{a})^m \\ \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} &= \sqrt[m]{a^{\frac{1}{n}}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{m \cdot n}} = m \cdot \sqrt[n]{a} \\ \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} &= \left(a^{\frac{1}{n}}\right) \cdot \left(b^{\frac{1}{n}}\right) = (ab)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{ab} \\ \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} &= \frac{a^{\frac{1}{n}}}{b^{\frac{1}{n}}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \text{ wenn } b \neq 0 \end{aligned}$$

1.8. Sinus & Cosinus

Bogenmaß	Grad	sin x	cos x	tan x
0π	0°	0	1	0
$\frac{1}{6}\pi$	30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
$\frac{1}{4}\pi$	45°	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1
$\frac{1}{3}\pi$	60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
$\frac{1}{2}\pi$	90°	1	0	$\pm\infty$
$\frac{2}{3}\pi$	120°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$
$\frac{3}{4}\pi$	135°	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	-1
$\frac{5}{6}\pi$	150°	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$
$\frac{1}{\pi}$	180°	0	-1	0
$\frac{7}{6}\pi$	210°	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
$\frac{5}{4}\pi$	225°	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	1
$\frac{4}{3}\pi$	240°	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\sqrt{3}$
$\frac{3}{2}\pi$	270°	-1	0	$\pm\infty$
$\frac{5}{3}\pi$	300°	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\sqrt{3}$
$\frac{7}{4}\pi$	315°	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	-1
$\frac{11}{6}\pi$	330°	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\sqrt{2} &\cong 0.70710678 \text{ und } \frac{1}{2}\sqrt{3} \cong 0.8660254 \\ \text{sowie } \frac{1}{\sqrt{3}} &\cong 0.577350269 \end{aligned}$$

2. Mengenlehre

2.1. Definition

Ist E eine Eigenschaft, die ein Element haben kann oder auch nicht, so beschreibt man die Menge der E erfüllenden Elemente durch:

$$A = \{x \mid x \text{ hat Eigenschaft } E\}$$

2.2. Teilmengen

Sind A und B Mengen, so heißt A Teilmenge oder auch Untermenge von B , wenn jedes Element von A auch Element von B ist.

Merke zu Teilmengen

- Jede Menge A ist Teilmenge von sich selbst, das heißt $A \subseteq A$
- Jede Menge A hat die leere Menge als Teilmenge, das heißt: $\emptyset \subseteq A$
- Ist $A \subseteq B$ und $B \subseteq C$, so folgt $A \subseteq C$
- Aus $A \subseteq B$ und $B \subseteq A$ folgt $A = B$

2.3. Operationen

$A \subseteq B$	A ist Teilmenge von B
$A \cup B$	A vereinigt B $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ oder } x \in B\}$
$A \cap B$	A geschnitten B $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ und } x \in B\}$
$A \setminus B$	A ohne B $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ und } x \notin B\}$
$\mathcal{P}(A)$	Potenzmenge A $\mathcal{P}(A)$ Potenzmenge der Menge A
$A \in B$	A Element von B A ist ein Element von B
$A \notin B$	A kein Element von B A ist nicht in B enthalten

2.4. Potenzmenge

Die Potenzmenge ist die Menge aller Teilmengen.

Es sei A eine Menge. Dann versteht man unter der Potenzmenge $\mathcal{P}(A)$ der Menge A die Menge aller Teilmengen von A . Auch die Menge \emptyset hat eine Teilmenge es gilt: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$.

Berechnet wird die Potenzmenge mit Hilfe von $2^{|A|}$ (Zwei hoch Kardinalität von A)

2.5. Kardinalität

Beschreibt die Menge aller Elemente einer Menge.

Es sei A eine endliche Menge. Dann versteht man unter der Kardinalität oder auch Mächtigkeit von A die Anzahl der Elemente von A und schreibt dafür $|A|$, manchmal auch $\#A$. Hat A unendlich viele Elemente, so sagt man, A hat die Kardinalität unendlich, und schreibt $|A| = \infty$

Beispiel

$$\begin{aligned} M &= \{1, 2\} \\ \mathcal{P}(M) &= \{\{\}, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} \\ \text{Nicht jedoch } \{2, 1\}! \text{ Es gilt } \{1, 2\} &= \{2, 1\}. \end{aligned}$$

2.6. Komplement

Das Komplement ist die Differenz zwischen gegebener Menge und Grundmenge.

2.7. Lösungsalgorithmus

Arbeitsablauf

- \setminus entfernen
- De Morgens Gesetze anwenden
- Assoziativ- und Distributiv- Gesetze im Wechsel mit dem Vereinfachen

2.8. Vereinfachen

$A \cup A = A$	$A \cap \emptyset = \emptyset$	$\overline{\overline{A}} = A$
$A \cap A = A$	$A \cup \overline{A} = G$	$\overline{\emptyset} = G$
$A \cup G = G$	$A \cap \overline{A} = \emptyset$	$\overline{G} = \emptyset$
$A \cap G = A$	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$	$\emptyset \neq \{\emptyset\}!!!$
$A \cup \emptyset = A$	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$	

2.9. Regeln

Kommutativ	$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$
Assoziativ	$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
Distributiv	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Adjunktiv	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$
de Morganschen Regeln	$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
de Morganschen Gesetz	$A \setminus B = A \cap \overline{B}$

2.10. Kartesisches Produkt

Das kartesische Produkt $A \times B$ (A kreuz B) ist die Menge aller geordneten Paare (a, b) mit $a \in A$ und $b \in B$

3. Relationen

3.1. Definition

Eine (zweistellige) Relation R ist eine Teilmenge des kartesischen Produkts zweier Mengen A und B .

$$R \subseteq A \times B$$

3.2. Äquivalenzrelation

Eine Äquivalenzrelation ist eine zweistellige Relation auf einer Ausgangsmenge M mit bestimmten Eigenschaften.

$$R \subseteq M \times M$$

Eigenschaften

1. Reflexivität

Jedes Element der Ausgangsmenge M steht mit sich selbst in Beziehung.

Für alle $a \in M$ gilt $(a, a) \in R$

2. Symmetrie

Zu jedem Paar (a, b) ist auch die Umkehrung in R enthalten.

Wenn $(a, b) \in R$, dann ist auch $(b, a) \in R$

3. Transitivität

Stehen drei Elemente verkettet in Beziehung, dann stehen sie auch direkt in Beziehung.

Wenn $(a, b), (b, c) \in R$ dann ist auch $(a, c) \in R$

4. Aussagenlogik

4.1. Operationen

$A \wedge B$	A und B	Konjunktion
$A \vee B$	A oder B	Disjunktion
$A \leftrightarrow B$	A genau dann, wenn B	Äquivalenz oder Bijunktion
$A \rightarrow B$	wenn A dann B	Implikation oder Subjunktion

4.2. Regeln

Kommutativ	$A \wedge B = B \wedge A$ $A \vee B = B \vee A$ $A \leftrightarrow B = B \leftrightarrow A$
Assoziativ	$A \wedge (B \wedge C) = (A \wedge B) \wedge C$ $A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C$ $A \leftrightarrow (B \leftrightarrow C) = (A \leftrightarrow B) \leftrightarrow C$
Distributiv	$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ $A \rightarrow (B \vee C) = (A \rightarrow B) \vee (A \rightarrow C)$ $A \rightarrow (B \wedge C) = (A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C)$ $(A \vee B) \rightarrow C = (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$ $(A \wedge B) \rightarrow C = (A \rightarrow C) \vee (B \rightarrow C)$
Adjunktiv (Absorption)	$A \wedge (A \vee B) = A$ $A \vee (A \wedge B) = A$
Klammerntausch	$A \rightarrow (B \rightarrow C) = (A \wedge B) \rightarrow C$
Kontraposition	$A \rightarrow B = \neg B \rightarrow \neg A$
de Morganschen Regeln	$\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$ $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$ $A \wedge \neg B = \neg(A \rightarrow B)$
Umwandeln	$A \vee \neg A = \text{immer Richtig!}$ $A \wedge \neg A = \text{immer Falsch!}$ $A \vee \neg A = \text{immer Richtig!}$ $A \wedge \neg A \vee B \wedge A = B \wedge A$

4.3. Beispiel

Günter fragt Anna: "Liebst du Peter, oder ist es nicht so, dass du Peter oder mich liebst?", darauf antwortet Anna "Nein".
Für die Aussage Anna liebt Peter setzen wir P und für Anna liebt Günther G. Die Frage lautet somit "Gilt P, oder gilt nicht $P \wedge G$ ". Formal bedeutet das:

$$P \vee \neg(P \wedge G)$$

Da Anna mit "Nein" antwortet muss der ganze Block negiert werden.

$$\neg(P \vee \neg(P \wedge G))$$

4.4. Wahrheitstabellen

Konjunktion (UND)			Disjunktion (ODER)		
A	B	$A \wedge B$	A	B	$A \vee B$
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

Bijunktion (ist richtig wenn beide Implikation (aus A folgt B) gleich sind)

A	B	$A \leftrightarrow B$	A	B	$A \rightarrow B$
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

A	B	C	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \wedge B \rightarrow A \vee B$	G
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1


5. Komplexe Zahlen

5.1. Notation

Kartesische Form
 $z = a + b \cdot i$

Trigonometrische Form / Polarform
 $z = |z| \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$

5.2. Visualisierung



$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \quad \text{siehe Tabelle xxx}$$

$$\tan(\varphi) = \frac{|b|}{|a|} \quad \cos(\varphi) = \frac{a}{|z|} \quad \sin(\varphi) = \frac{b}{|z|}$$

x,y	(in Grad)	(im Bogenmaß)
$a > 0, b \geq 0$	$\varphi = \arctan \frac{b}{a}$	$\varphi = \arctan \frac{b}{a}$
$a < 0$	$\varphi = \arctan \frac{b}{a} + 180^\circ$	$\varphi = \arctan \frac{b}{a} + \pi$
$a > 0, b \leq 0$	$\varphi = \arctan \frac{b}{a} + 360^\circ$	$\varphi = \arctan \frac{b}{a} + 2\pi$
$a = 0, b > 0$	$\varphi = 90^\circ$	$\varphi = \frac{\pi}{2}$
$a = 0, b < 0$	$\varphi = 270^\circ$	$\varphi = \frac{3\pi}{2}$
$a = 0, b = 0$	$\varphi = 0^\circ$	$\varphi = 0$

5.3. Potenzen von i

$$i = \sqrt{-1} \quad i^4 = 1$$

$$i^2 = -1 \quad i^5 = i$$

$$i^3 = -i \quad i^6 = -1 \dots$$

5.4. Rechenoperationen

Addition

$$z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di) \quad z_1 - z_2 = (a + bi) - (c + di)$$

$$= a + c + (b + d)i \quad = a - c + (b - d)i$$

Multiplikation

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di)$$

$$= ac + adi + bci + bdi^2$$

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1| (\cos(\varphi_1) + \sin(\varphi_1)i) \cdot |z_2| (\cos(\varphi_2) + \sin(\varphi_2)i)$$

$$= |z_1| \cdot |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + \sin(\varphi_1 + \varphi_2)i)$$

Division

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi) \cdot (c - di)}{(c + di) \cdot (c - di)}$$

$$= \frac{ac - adi + bci - bdi^2}{c^2 - (di)^2}$$

$$= \frac{ac + bd + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}$$

$$= \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{(bc - ad)}{c^2 + d^2}i$$

Potenzierung

$$z^n = (a + bi)^n$$

$$= (|z| \cdot (\cos \varphi + \sin \varphi i))^n$$

$$= |z|^n \cdot (\cos(n \cdot \varphi) + \sin(n \cdot \varphi)i)$$

Wurzel $\{k \in \mathbb{N} | k = 0 \text{ bis } n - 1\}$

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{a + bi}$$

$$z_k = \sqrt[n]{|z|} \cdot \left(\cos\left(\frac{\varphi + k \cdot 360}{n}\right) + \sin\left(\frac{\varphi + k \cdot 360}{n}\right)i \right)$$

Es gibt immer n Ergebnisse die in z_k für $k = 0$ bis $k = n - 1$ berechnet werden.

6. Vektoren und Matrizen

Matrizen vom Typ (m,1) sind Vektoren (1-Spaltig). Die Zeilen eines Vektors sind auch die Dimension des Vektors. Ein Zeilenvektor ist eine Matrix vom Typ (1, n).

6.1. Rechenoperationen

6.1.1. Skalar

Die Addition, Subtraktion und Multiplikation von Matrizen mit einem Skalar (einer Zahl) c.

$$-1 \cdot A = -A$$

$$c \cdot A = A \cdot c = Ac = cA$$

$$c_1 \cdot (c_2 \cdot A) = (c_1 \cdot c_2) \cdot A$$

$$(c_1 + c_2) \cdot A = c_1 \cdot A + c_2 \cdot A$$

$$c \cdot (A + B) = cA + cB$$

6.1.2. Multiplikation

- Zeile von Matrix A mal Spalte von Matrix B
- Matrix A muss so viele Spalten haben wie Matrix B Zeilen hat
- Nicht Kommutativ!! $A \cdot B \neq B \cdot A$

6.1.3. Determinante

- Ist $\det A \neq 0$ dann ist die Matrix invertierbar
- Ist $\det A = 0$ dann ist die Matrix linear abhängig
- Schachbrettmuster (beginnend oben links mit + + - ..)
- Entwicklung am einfachsten nach der Spalte oder Zeile mit den meisten 0er.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\det A = -4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= -4 \cdot (1 \cdot 5 - 1 \cdot 3) = -8$$

6.2. Inverse Matrix

Invertierbar sind nur Matrizen des Typ (n, n) also quadratische Matrizen. Eine Matrix ist dann invertierbar wenn die Determinante $\neq 0$ ergibt.

$$A^{-1} \cdot A = I \quad (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

$$A \cdot A^{-1} = I \quad I \cdot A = A$$

$$I \cdot A^{-1} = A^{-1}$$

7. Vektoren

7.1. Vektor aufstellen

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix} \quad \vec{AB} = \begin{pmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \\ b_3 - a_3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}$$

7.2. Rechenoperation

Addition $\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{pmatrix}$

Multiplikation $\vec{a} = c \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cb_1 \\ cb_2 \end{pmatrix}$

Betrag $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$

Skalarprodukt $\vec{a} * \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$

Kreuzprodukt (Abb. ??) $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{n} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$

Ist das Skalarprodukt = 0 dann sind die Vektoren orthogonal (senkrecht) zueinander!

8. Geraden und Ebenen

8.1. Schnittpunkte

Gerade Den Schnittpunkt von zwei Geraden erhält man indem man die beiden Geradengleichungen gleich setzt.
Ebene Bei Einer Ebene funktioniert die Berechnung des Schnittpunktes analog zu dem einer Geraden.

8.2. Winkel

Gerade und Gerade

Gerade und Ebene

$$\cos \alpha = \left| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \right| \quad \cos \alpha = \left| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \right|$$

8.3. Formen

8.3.1. Geraden

Allgemeine Form:

$$\vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}$$

\vec{p} = Stützvektor und \vec{u} = Richtungsvektor.

8.3.2. Ebenen

Parameterform $E: \vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u} + s \cdot \vec{v}$

Normalform $\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0$

\vec{p} = Stützvektor und \vec{u}, \vec{v} = Spannvektor

Umformen:

- Parameter \rightarrow Normalform
- $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ (Kreuzprodukt der Richtungsvektoren)
- $\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0$
- Koordinatenform aufstellen
 $\vec{n} \cdot \vec{x} = \vec{n} \cdot \vec{p}$ (Normalform aus multipliziert)

9. Grenzwerte

Der Grenzwert oder Limes einer Folge ist eine Zahl, der die Folge beliebig nah kommt. Eine Folge ist **konvergent** wenn sie solch einen Wert besitzt, ansonsten **divergent**

9.1. Berechnung

Bei $n \rightarrow \infty$ teilt man durch die variable mit der höchsten Potenz, das Ergebnis ist dann der Grenzwert.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 1}{n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 2n^2 - 1}{\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 + 1} = \frac{2}{1} = 2$$

Ergebnisse

$$\frac{1}{1} = 1 \quad \frac{1}{0} = \infty \quad \frac{0}{1} = 0 \quad \frac{1}{17} = \frac{1}{17}$$

Vorsicht bei $\lim_{n \rightarrow a}$, also Limes gegen eine Zahl a . Zunächst setzt man die

Zahl a ein und prüft das Ergebnis. Es darf nicht $\frac{0}{0}$ raus kommen. Es wird sich im Zähler und/oder Nenner ein $n - a$ befinden. Die Folge muss dann in Linearfaktoren zerlegt werden und danach die 3 eingesetzt werden.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 6x^2 + 5x}{2x^2 + 32x - 34} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)(x-5)}{2(x-1)(x+17)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-5)}{2(x+17)} = \frac{-4}{36} = -\frac{1}{9}$$

Ablauf bei $\lim_{n \rightarrow a}$

- Schauen ob man etwas ausklammern kann oder muss
- Anwendung der p-q Formel um die Nullstellen zu berechnen
- Sind die Nullstellen $x_1 = -4$ und $x_2 = 5$ dann ist die Auflösung der Binomischen Formel $(x+4)(x-5)$
- Binomische Formel zur Kontrolle ausmultiplizieren
- Nun im Zähler und Nenner kürzen
- Danach wird a eingesetzt und das Ergebnis ist der Grenzwert.

Der Satz von l'Hospital ist anwendbar wenn im Zähler und Nenner 0 oder beide ∞ sind.

Hierbei wird der Zähler und Nenner separat abgeleitet und der Limes vom somit entstandenen Bruch berechnet. Hierbei gilt wieder die Ergebnis-tabelle oben.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \sin 2x}{e^x - e(-x)} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2x \cdot \cos 2x}{e^x + e(-x)} = \frac{0}{1} = 0$$

10. Konvergenz von Reihen

Es sei eine Reihe $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ gegeben. So ist diese (absolut) konvergent nach folgenden Kriterien (siehe auch Formelsammlung S. 76):

Quotientenkriterium	$q = \lim_{i \rightarrow \infty} \left \frac{a_{i+1}}{a_i} \right $
Wurzelkriterium	$q = \lim_{i \rightarrow \infty} \sqrt[i]{ a_i }$
Leibnitzkriterium	siehe 10.3
Majorantenkriterium	siehe 10.2
Minorantenkriterium	siehe 10.1

$q < 1 \Rightarrow$ Reihe konvergiert $q > 1 \Rightarrow$ Reihe divergiert $q = 1$ keine Aussage

Gegeben sind die Reihen:

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i; \sum_{i=0}^{\infty} b_i$$

10.1. Majorantenkriterium

ist $b_i \geq 0$ konvergent für alle i . Gilt dann $|a_i| \leq b_i$ für alle i , so konvergiert die Reihe mit a_i absolut.

10.2. Minorantenkriterium

ist b_i eine divergente Reihe mit $b_i \geq 0$ für alle i . Gilt dann $|a_i| \geq b_i$ für alle i , so konvergiert die Reihe mit a_i nicht.

10.3. Leibnitzkriterium

Bedingungen

- Eine Alternierende Reihe
- $\lim_{i \rightarrow \infty} u_i = 0$
- strenge Monotonie $\forall i \Rightarrow u_i > u_{i+1}$ wenn u_i positiv oder $u_i < u_{i+1}$ falls sie negativ sind.

Es sei u_i eine Folge von Zahlen, die entweder alle positiv oder alle negativ sind. Somit entspricht die folgende Reihe einer **alternierenden** Reihe:

$$\sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i u_i$$

Vorsicht!

Dies bedeutet nicht ... Ausführliche Konvergenzbedingungen Seite 73 / 74 in Formelsammlung

11. Potenzreihen

Es sei:

$$P(x) = \sum_{i=0}^{\infty} c_i (x - x_0)^i$$

11.1. Konvergenzradius

Der Konvergenzradius r beschreibt den maximalen Abstand von x_0 zu einem Konvergenzpunkt. Konvergent sind alle r für die gilt:

$$< x_0 - r, x_0 + r >$$

Das Verhalten im Randpunkten muss separat bestimmt werden. Die spitzen Klammern sind dann gegen] (wenn die Grenze enthalten ist) oder) (wenn die Grenze nicht enthalten ist) auszutauschen.

Zur Berechnung gibt es die folgenden beiden Methoden:

$$r = \lim_{i \rightarrow \infty} \left| \frac{c_i}{c_{i+1}} \right|$$

$$r = \frac{1}{\lim_{i \rightarrow \infty} \sqrt[i]{|c_i|}}$$

11.2. Operationen

$$P_1(x) = \sum_{i=0}^{\infty} c_i (x - x_0)^i$$

$$P_2(x) = \sum_{i=0}^{\infty} b_i (x - x_0)^i$$

11.3. Taylorreihen

Die Taylorreihe von f ist definiert durch:

$$T_f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} \cdot (x - x_0)^i$$

Voraussetzung ist das f unendlich oft differenzierbar ist. Bricht man die Summation nach n Summanden ab erhält man das Taylorpolynom vom Grad n . **Restglieddarstellungen**

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$$

und

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1}$$

12. Funktionen

12.1. Grundlagen

Tangente	$y(x) = mx + b$
Tangente	$y(x) = f'(x_0) \cdot x + f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_0$
Lineare Funktion	$y(x) = ax^2 + 2bx + c$

12.2. Polynomdivision

$$\frac{x^2 + 3x + 16}{x - 2}$$

Ablauf Polynomdivision

- Größte Exponent aus beiden Polynomen ermitteln
- Dividieren und zurückmultiplizieren
- Subtrahieren und von vorne beginnen
- Rest aufschreiben

12.3. Partialbruchzerlegung

$$\frac{x^2 + 16}{x \cdot (x - 2)}$$

Partialbruchzerlegung bei reellen Nullstellen

- Den Nennerpolynom in Linearfaktoren aufteilen
- Aufteilen der Linearfaktoren auf die Partialbrüche
- Im Zähler steht jeweils eine Konstante
- Nun mit dem Nennerpolynom multiplizieren
- Die Nenner aus den Brüchen kürzen
- Die Nullstellen der Linearfaktoren einsetzen
- Die Variablen ausklammern und nach Exponent sortieren.
- Restliche Konstanten mit einem LGS bestimmen

12.4. Flächenberechnung

Die Fläche unter einer Kurve entspricht ihrem Integral.

zwischen zwei Funktionen

- die Funktionen gleich setzen: $f(x) - g(x) = h(x)$
- Schnittpunkte ermitteln $h(x) = 0$
- $h(x)$ integrieren und die Nullstellen als Grenzen einsetzen.
- Mehrere Schnittpunkte müssen einzeln berechnet werden.
- Ergebnisse zusammenrechnen.

12.5. Kurvendiskussion

In x_0 gilt:

lokales Max-/Minimum	$f'(x_0) = 0$
lokales Minimum	$f'(x_0) = 0 \Rightarrow f''(x_0) > 0$
lokales Maximum	$f'(x_0) = 0 \Rightarrow f''(x_0) < 0$
lokales Minimum	n ist gerade $\Rightarrow f^n(x_0) > 0$
lokales Maximum	n ist gerade $\Rightarrow f^n(x_0) < 0$
Wendepunkt	Bedingung: $f''(x_0) = 0$

Vorzeichenwechsel: $f' \rightarrow f'''(0) \neq 0$
 zusätzlich zu Wendepunkt-bed.: $f'(x) = 0$
 Pol $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm \infty$

Auf dem Intervall I gilt:

konvex	$f''(x) \geq 0 \forall x \in I$
konkav	$f''(x) \leq 0 \forall x \in I$
monoton steigend	$f'(x) \geq 0 \forall x \in I$
monoton fallend	$f'(x) \leq 0 \forall x \in I$
streng monoton steigend	$f'(x) > 0 \forall x \in I$
streng monoton fallend	$f'(x) < 0 \forall x \in I$

Wendepunkt bedeutet der Drehsinn der Kurventangente wird geändert.

13. Integrale

Lineare Gleichung → einfache Ableitung

13.1. Analyse des Integrals

Produkt	Partielle Integration Substitution
Brüche	Umformen zu einem Produkt Partialbruchzerlegung Polynomdivision

13.2. Substitutionsregel

Voraussetzung ist das es eine innere Funktion gibt!

Gegeben sind zwei Funktionen bei der die eine aus einer inneren und äußeren Funktion besteht und die andere als Ableitung der inneren Funktion geschrieben werden kann.

$$\int f(x)dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t)dt$$

So lässt sich das Integral durch Substitution vereinfachen und das Ergebnis zurück substituieren.

Beispiel:

$$\int \frac{x^2}{x^3 - 17} dx = \int x^2 \cdot \frac{1}{x^3 - 17}$$

$$g(x) = x^3 - 17 \Rightarrow g'(x) = 3x^2$$

$$\frac{1}{3} \int 3x^2 \cdot \frac{1}{x^3 - 17} dx \Rightarrow \frac{1}{3} \int g'(x) \cdot f(g(x)) dx$$

$$g'(x) = \frac{dg}{dx} \Rightarrow dg = g'(x) dx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \int \frac{1}{g} dg = \frac{1}{3} \ln(g) + c$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \ln(x^3 - 17) + c$$

13.3. Partielle Integration

$$\int f(x) * g(x) dx$$

Gegeben sei ein Integral mit den Funktionen f(x) und g(x). Bei der Substitution setzt man nun eine der beiden Funktionen als Abgeleitet voraus und integriert diese. Im folgenden wird f(x) als abgeleitet gesetzt. Somit ist h'(x) = f(x) und h(x) = ∫ f(x).

$$\int h'(x) * g(x) dx = h(x) \cdot g(x) - \int g'(x) \cdot h(x) dx$$

Nicht immer ist der erste Ansatz zielführend.

13.4. Anwendungen

Uneigentliches Integral

Ist eine der Grenzen des Integrals mit ∞ gegeben, so gilt für das Integral:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

und analog auch im positiven Bereich

Volumen eines Rotationskörper

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Bogenlänge

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

13.5. Numerische Integration

Es gibt verschiedene Verfahren zur Berechnung von Näherungen von Integralen. Eines davon ist die **Trapezregel**:

$$T_n = \frac{h}{2} \cdot (y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \dots + 2y_{n-1} + y_n)$$

Die Schrittweite zwischen den betrachteten Punkten:

$$h = \frac{b-a}{n}$$

Für den Abstand zwischen Näherung und Integralwert gilt:

$$|T_n - \int_a^b f(x) dx| \leq h^2 \cdot \frac{b-a}{12} \cdot \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$$

Eine genauere Methode bietet die **Simpsonregel**:

$$h = \frac{b-a}{2n}$$

$$S_n = \frac{h}{3} (\Sigma_1 + 4 \cdot \Sigma_2 + 2 \cdot \Sigma_3)$$

Wobei gilt:

Σ₁ = Die Summe von f₀ und f_{2n}
Σ₂ = Die Summe von f_i mit ungeradem i
Σ₃ = Die Summe von f_i mit geradem i

Für die Genauigkeit gilt hier:

$$|S_n - \int_a^b f(x) dx| \leq h^4 \cdot \frac{b-a}{180} \cdot \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|$$

14. Differenzialgleichung

14.1. Differenzierbarkeit einer Funktion

Gegeben ist eine Funktion f(x) deren Differenzierbarkeit in einem Punkt x₀ bestimmt werden soll. Dann gilt, wenn der lim_{x→x₀} existiert, ist die Funktion für in x₀ Differenzierbar.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

14.2. Differenzialgleichung 1. Ordnung

14.2.1. Trennung der Variablen

Gegeben ist eine Differenzialgleichung der Form:

$$y' = g(x) * h(y)$$

dann schreibt man diese um zu:

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx$$

und löst zu y auf.

14.2.2. Variation der Konstanten

mit reellen Funktionen g₁(x) und g₂(x) wird eine Differenzialgleichung erster Ordnung folgender Form **variierbare** Differenzialgleichung genannt:

$$y' = y \cdot g_1(x) + g_2(x) \quad (1)$$

Lösungsweg mit Beispiel

1. Untersuchen der Differenzialgleichung

$$y' = -2xy + x \cdot e^{-x^2}$$

2. Man erstellt die Lösung des homogenen Problems gemäß 14.2.1 :

$$g_1(x) = -2x \Rightarrow y_h(x) = C \cdot e^{-x^2}$$

3. Ersetzen (variieren) der Konstante C durch C(x)

$$y(x) = C(x) * e^{-x^2}$$

4. Bestimmung der Ableitung y'(x)

$$y'(x) = C(x)(-2x)e^{-x^2} + C'(x)e^{-x^2}$$

5. Einsetzen der Gleichungen von Punkt 3. 4. in die Differenzialgleichung 1.

$$C(x)(-2x)e^{-x^2} + C'(x)e^{-x^2} = (-2x)C(x) \cdot e^{-x^2} + x \cdot e^{-x^2}$$

$$\Rightarrow C'(x)e^{-x^2} = x \cdot e^{-x^2}$$

6. Bestimmung von C'(x)

$$C'(x) = x$$

7. Integrieren von C'(x)

$$C(x) = \frac{x^2}{2} + K$$

8. Einsetzen in die Gleichung von Punkt 3.

$$y(x) = \left(\frac{x^2}{2} + K \right) \cdot e^{-x^2}$$

14.3. Lineare Differenzialgleichung - Homogener Fall

Lösungsweg

1. Differenzialgleichung analysieren
2. Charakteristische Polynom aufschreiben
3. Die Nullstellen finden
4. Fundamentalmenge aufschreiben
5. Allgemeine Lösung aufschreiben / ableiten
6. Anfangswerte einsetzen
7. Lösung des Anfangswertproblems aufschreiben

Sei die Differenzialgleichung der Form:

$$y^n + a_{n-1}y^{n-1} + \dots + a_1y' + a_0y = 0$$

Dann bestimmt man das **charakteristische Polynom**

$$p(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$$

Das charakteristische Polynom n-ter Ordnung hat nun k verschiedene **reelle Nullstellen** λ₁, ... λ_k mit der jeweiligen Vielfachheit μ₁ ... μ_k, wobei gilt μ₁ + ... μ_k = n
Dann bildet die Funktionenmenge

$$e^{\lambda_1 x}, x e^{\lambda_1 x}, \dots, x^{\mu_1 - 1} e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_k x}, \dots, x^{\mu_k - 1} e^{\lambda_k x}$$

ein **Fundamentalsystem** dieser Differenzialgleichung.

Achtung bei komplexen Nullstellen des charakteristischen Polynoms!!

Für Gleichung 2. Ordnung sei die Form:

$$y'' + a_1y' + a_0y = 0$$

Dann gilt: D = $\frac{a_1^2}{4} - a_0 < 0$ (=komplexe Lösung)

Dann lässt sich der Lösungsweg wie folgt abkürzen:

$$\alpha = -\frac{a_1}{2} \text{ und } \beta = \sqrt{-\left(\frac{a_1^2}{4} - a_0\right)}$$

$$(x) = c_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + c_2 e^{\alpha x} \sin \beta x$$

14.4. Lineare Differenzialgleichung - Inhomogener Fall

Allgemein hat die Differenzialgleichung dann die Form:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = b(x)$$

Allgemeine Lösung:

- Bestimmen der allgemeinen Lösung der zugehörigen homogenen Gleichung

- addieren einer speziellen Lösung y_p(x) (**partikuläre Lösung**) Hierfür benötigt man meist eine **Ansatzfunktion**:

1. b(x) ist in der Form f(x) · e^{ax}

- Dabei ist f(x) ein Polynom m-ten Grades und a eine reelle Zahl
- Dann gilt: Ist a eine k-fache Nullstelle des charakteristischen Polynoms so gibt es eine partikuläre Lösung der Form

$$y_p(x) = x^k \cdot q(x) \cdot e^{ax}$$

Mit einem Polynom q(x) vom Grad m. Ist a keine Nullstelle so ist k = 0 zu setzen.

- Koeffizientenvergleich um q(x) zu bestimmen.
- Die allgemeine Lösung setzt sich zusammen aus der Lösung der homogenen Gleichung y_h(x) und der partikulären Lösung y_p(x)

2. Die Differenzialgleichung hat die Form

$$y' + ay = d_1 \sin(\omega x) + d_2 \cos(\omega x)$$

- Feste reelle Zahlen a, d₁, d₂, ω

- Dann gibt es eine partikuläre Lösung der Form

$$y_p(x) = b_1 \sin(\omega x) + b_2 \cos(\omega x)$$

mit demselben ω

3. Die Differenzialgleichung hat die Form

$$y'' + a_1y' + a_0y = d_1 \sin(\omega x) + d_2 \cos(\omega x)$$

- mit festen reellen Zahlen a₀, a₁, d₁, d₂, ω

- Dann gilt:

- Ist iω keine Nullstelle des charakt. Polynoms dann gibt es eine Lösung der Form:

$$y_p(x) = b_1 \sin(\omega x) + b_2 \cos(\omega x)$$

- sonst

$$y_p(x) = x \cdot (b_1 \sin(\omega x) + b_2 \cos(\omega x))$$

15. Wahrscheinlichkeiten

15.1. Wahrscheinlichkeitsraum

Sei F ein Ereignisfeld, p eine Wahrscheinlichkeit auf F und Ω ein Ergebnisraum von F , so nennt man das Tripel (Ω, F, p) einen Wahrscheinlichkeitsraum. (F, p) ist ein Wahrscheinlichkeitsfeld.

15.2. Zufallsgröße

Sei (Ω, F, p) ein Wahrscheinlichkeitsraum. Dann ist:

Eine auf Ω definierte reelle Funktion X heißt **Zufallsgröße**, wenn für jede reelle Zahl x gilt: $\{\omega \in \Omega; X(\omega) \leq x\} \in F$ (Abkürzung: $(X \leq x) \in F$)

Außerdem heißt für alle $x \in R$ durch $F_X(x) = p(X \leq x)$ definierte Funktion **Verteilungsfunktion** (kurz: Verteilung) von X **Eigenschaften einer Verteilungsfunktion:**

- $0 \leq F_X(x) \leq 1$ für alle $x \in R$
- $F_X(x)$ ist auf ganz R monoton steigend.
-

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$$

und

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$$

- $F_X(x)$ ist auf ganz R rechtsseitig stetig
- Für alle $a < b \in R$ ist:

$$p(a < X \leq b) = p(X \leq b) - p(X \leq a) = F_X(b) - F_X(a)$$

- Für alle $a < b \in R$ ist

$$\begin{aligned} p(a < X < b) &= p(X < b) - p(X \leq a) \\ &= \lim_{x \rightarrow b, x < b} F_X(x) - F_X(a) \end{aligned}$$

15.3. Diskrete Verteilungen

hat nur endlich viele oder abzählbar viele Werte. Sei X eine diskrete Zufallsgröße mit Werten $\{x_k\}$ und zugehörigen Wahrscheinlichkeiten $\{p_k\}$. Dann ist für jedes x die Verteilungsfunktion wie folgt zu berechnen:

$$F_X(x) = \sum_{k \text{ mit } x_k \leq x} p_k$$

15.4. Erwartungswert

nennt man

$$E(X) = \sum_k x_k \cdot p_k$$

von X , wenn X eine diskrete Zufallsgröße ist und p_k die Einzelwahrscheinlichkeiten. Voraussetzung für dessen Existenz ist $\sum_k |x_k| \cdot p_k < \infty$

Es sei X eine diskrete Zufallsgröße mit Erwartungswert $E(X)$. Dann nennt man im Fall der Existenz die Zahl $V(X) = E((X - E(X))^2) = \sum_k (x_k - E(X))^2 \cdot p_k$ die **Varianz von X**. Die Quadratwurzel daraus, $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ nennt man die **Standardabweichung** der Zufallsgröße X .

Die Varianz ist genau dann gleich null, wenn die Verteilung der Zufallsgröße in einem Punkt konzentriert ist. $P(X = c) = 1$ Man nennt dies **Einpunktverteilung**

Steinersche Gleichung

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Es gilt:

$$p(|X - E(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{V(X)}{\epsilon^2}$$

gleichverteilt, wenn die Zufallsgröße X endlich viele Werte $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ mit den Wahrscheinlichkeiten

$$p_k = p(X = x_k) = \frac{1}{n}$$

für $k = 1, 2, \dots, n$ annehmen kann. Dann gilt Erwartungswert

$$E(X) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$

und die Varianz

$$V(X) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k\right)^2$$

15.5. Binomialverteilung

Eine Zufallsgröße heißt binomialverteilt mit Parametern n und p , wenn sie die Werte $k = 1, 2, \dots, n$ mit den Wahrscheinlichkeiten

$$p_k = p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

annehmen kann.

Es gilt dann für den Erwartungswert: $E(X) = n \cdot p$ und für die Varianz: $V(X) = n \cdot p \cdot (1-p)$

15.6. Normalverteilung

$$f_X(x) = \phi(x, \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Es sei X eine $N(\mu, \sigma^2)$ -verteilte Zufallsgröße. Dann gilt für alle reellen Zahlen a und b mit $a \leq b$:

$$p(X \leq a) = p(X < a) = \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

$$p(X \geq b) = 1 - p(X < b) = 1 - \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

$$p(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

Ist $\Phi(-x)$ gilt immer $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$!

Tabelle der Standardisierten Normalverteilung MAI10 S. 79

15.7. Poisson-Verteilung

Ist anwendbar, wenn bei der Binomialverteilung ein sehr großes n gegenüber einem kleinem p steht. Es gilt dann

$$\lim_{n \rightarrow \infty, n \cdot p \rightarrow \lambda} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$$

Eine Zufallsgröße X besitzt eine Poisson-Verteilung, wenn sie die abzählbar unendlich vielen Werte $k = 0, 1, 2, 3, \dots$ mit den Einzelwahrscheinlichkeiten

$$p_k = p(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$$

für $k = 0, 1, 2, \dots$ annehmen kann. $\lambda = n \cdot p$ Für die Zufallsgröße X gilt dann: Erwartungswert $E(X) = \lambda$ und Varianz $V(X) = \lambda$